

RELACION ENTRE ALGUNOS FACTORES GERIATRICOS Y LA PRESENCIA DE FRAGILIDAD EN COMUNIDAD. 2006.

LUIS ANDRES MONTENEGRO SALDAÑA
LAMSMONTENEGRO29@GMAIL.COM

COAUTORES: SALAZAR C, MONTENEGRO R.

INSTITUCIONES: SERVICIO DE GERIATRIA. HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN. ESSALUD. LIMA. PERU

OBJETIVOS: DETERMINAR LA RELACION ENTRE ALGUNOS FACTORES GERIATRICOS Y LA PRESENCIA DE FRAGILIDAD EN ANCIANOS DE COMUNIDAD

DISEÑO: CORRELACIONAL, TRANSVERSAL. SE EVALUA LA TOTALIDAD DE ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A UNA CAMPAÑA DE SALUD CONVOCADA POR EL SERVICIO DE GERIATRIA

LUGAR: HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA. ESSALUD. LIMA, PERU

PACIENTES: 154 PACIENTES, EDAD PROMEDIO DE 72.1 +- 8 (60-91a). MUJERES 59.7% (92).

MEDICIONES: TEST DE BARBER DE FRAGILIDAD
ESCREENING DE SINDROME DE CAIDAS
TEST DE KATZ
DSM IV DE DEPRESION
CRITERIOS DE DETERIORO COGNITIVO LEVE
ESCALA DE PROBLEMA SOCIAL DE GIJON ADAPTADA POR UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA. PERU
INDICE DE MASA CORPORAL
CRITERIOS DE INCONTINENCIA DE ORINA

RESULTADOS: LOS FACTORES GERIATRICO MAS FRECUENTEMENTE PRESENTES EN AQUELLO POSITIVOS AL TEST DE BARBER DE FRAGILIDAD SON EL SINDROME DE CAIDAS (56.8% DE FRAGILES, 42 PACIENTES), LA DEPRESION (51,4%; 38 PACIENTES); EL DETERIORO COGNITIVO LEVE (73%; 54); LA INCONTINENCIA DE ORINA (56,8%; 42); EL SEXO FEMENINO (56.8%; 42 PACIENTES). TIENEN UNA MINIMA PRESENCIA LA DEPENDENCIA FUNCIONAL (2,7%; 2 PACIENTES); LA PRESENCIA DE PROBLEMA SOCIAL (5,4%; 4 PACIENTES); EL IMC MENOR DE 21 (29,7%; 22).

CONCLUSIONES: SON DIVERSOS, Y VARIADOS EN INTENSIDAD Y PRESENTACION, LOS FACTORES GERIATRICOS RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE FRAGILIDAD EN ANCIANOS EN COMUNIDAD.