

TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR I Y DETERIORO COGNITIVO EN MAYORES DE 55 AÑOS

Rafael Patrocinio Alarcón Velandia
alarcon@utp.edu.co

COAUTORES: Benitez M, Ramirez M

INSTITUCIONES: Grupo de Psicogeriatría y Demencias, Universidad
Tecnológica de Pereira, Colombia

OBJETIVOS

- 1- Comparar el deterioro cognitivo en ancianos con Trastorno Afectivo Bipolar con aquellos que no lo padecen.
- 2- Detectar síntomas de deterioro cognitivo prodrómicos de riesgo de iniciar un cuadro demencial.
- 3- Determinar el deterioro cognitivo en las fases depresiva, maníaca o de estabilización.

LUGAR: Facultad de Ciencias de la Salud Universidad tecnológica de Pereira, Instituto del sistema Nervioso de Risaralda

PACIENTES: Mayores e 55 años consultantes al Instituto del sistema Nervioso de Risaralda

Resumen

La ponencia pretende revisar el impacto en el tiempo del Trastorno Afectivo Bipolar I en las funciones mentales de pacientes mayores de 55 años, si existe una relación causal para el deterioro cognitivo o el inicio de un síndrome demencial. Se revisa la literatura existente sobre el tema y las investigaciones en este campo del conocimiento realizadas por el grupo de Psicogeriatría y demencias de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira.