

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NEUROPSICOLÓGICO ENTRE DEMENCIA DE ALZHEIMER Y VASCULAR

Myriam Jesus Jacintho Lima Santos
myriamjlima@uol.com.br

Objetivos: traves de la evaluación cognitiva y exámenes radiológicos sugerir un diagnostico lo más correcto posible.

En ea solo con una biopsia o necropsia, por eso sugiro...

Diseño: encamiñamiento medico, exames que descarten demencias reversibles, testes especialies a cada tipo de enfermedad

Lugar: consultorio (encuesta en un centro dia)

Pacientes: general, depresión, deterioro cognito leve, etc.

Intervenciones: orientación a familia, al paciente, observaciones legales

Mediciones: traves de los testes

Resultados: lo que surge con la paontuación derivada de los testes y de la observación

Conclusiones: diagnosticodiferencial europsicológico entre la demencia de :alzheimer y demencia vascular

Este trabajo procura presentar las diferencias más notadas entre los dos cuadros demenciales de mayor incidencia en la población arriba de 50 años.

La EA es una demencia degenerativa del sistema nervioso, caracterizada por una presentación insidiosa, progresiva e histológica por placas seniles y degeneración neurofibrilar con ausencia de cualquiera otra enfermedad específica afectando el cerebro; memoria , asociada, por lo menos, a un déficit en otras áreas de cognição.

Presenta, los factores dominantes como edad, historia familiar positiva, responsable en casos prematuros con herencia autossómica dominante juntamente con factores etnicos y geográficos, falta de activación en los campos hipocampales.

Los síntomas más comunes son la pérdida de memoria, disminución de las actividades cotidianas, comprometimiento del juicio, desorientación temporal, desorientación espacial, dificultad en el aprendizaje, pérdida progresiva en la comunicación verbal, dentre otras.

La Demencia Vascular es después de la demencia de Alzheimer la segunda causa más común en los cuadros de demencias, tiene inicio abrupto, escalonado, con histórico de Accidente vascular cerebral, hipertensión

arterial, arteriosclerosis asociada, bien como señales focales y síntomas neurológicos.

Presenta alteraciones en la memoria y en el lenguaje, ataxia, hemiparesia, disartria, disfagia, labilidad emocional y síndrome depresivo frecuente.

En la ENP, los neuropsicólogos usan testes iguales en algunas cosas y otras específicas para cada una de las enfermedades, dentro de los consensos aceptos por su país. Tienen que tener conocimiento de como evaluar las estructuras cruciales para los procesos cognitivos, como memoria y otros, asi como histórico familiar(Síndrome de Down, etc).

Los testes más usados son : mini mental, reloj, Blesse, span(dígitos y letras), fluencia verbal, esdcalas de: hachinski, AVDS, hamilton; pruebas de rey, cubois Wais, torre de londres, tail making.

Lo más, la importancia del conocimiento del NEUROPSIOLOGO EN EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.